



# or-7. 正規分布

(Excel によるオペレーションズリサーチ演習)

URL: <https://www.kkaneko.jp/cc/or/index.html>

金子邦彦



# Excel で乱数



- =RAND()

0 以上 1 未満の乱数

- =IF(RAND() < 0.5, 1, 0)

乱数が 0.5 より小さければ 1, さもないければ 0

# コイン投げのシミュレーション




- コインを 50 枚投げる
- 表が出る確率 0.5, 裏が出る確率 0.5
- それを繰り返す

# Excel 演習



- 新しくやりなおしたいので、次のように操作して、新しく空白のブックを作りなさい



「ファイル」を  
クリック

「新規」  
をクリック

空白のブック



## セル A1 に「0.5」

	A	B	C	D
1	0.5			

## セル A2 に次の式

	A	B	C	D	E	F
1	0.5					
2	0					
3						



セル A2 の式を, A3 から A51 に「コピー&貼り付け」しなさい.

右クリックメニューが便利

セル A52 に次の式

**=SUM(A2:A51)**

The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns A through E and rows 46 through 52. The formula bar at the top shows the formula =SUM(A2:A51) entered in cell A52. The spreadsheet data is as follows:


	A	B	C	D	E
46	1				
47	1				
48	0				
49	1				
50	0				
51	0				
52	19				

**50** 枚のうち,  
表になるのは何枚になりそうか

※ **乱数**なので, 実行のたびに違った値になる



# A2 から A52 を範囲選択して，右クリックメニューで「コピー」



それを，B2から E52に張り付け

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
82	0	-1	-2	-1	0	1	0	1	0	1	0
83	0	1	0	-1	-2	-3	-4	-3	-2	-3	-2
84	0	-1	-2	-3	-2	-3	-4	-3	-4	-3	-4
85	0	-1	0	-1	-2	-1	-2	-3	-4	-5	-6
86	0	-1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-5	-6
87	0	1	0	1	2	3	2	1	0	-1	-1
88	0	-1	0	-1	-2	-3	-4	-3	-2	-3	-2
89	0	-1	-2	-1	-2	-1	0	-1	-2	-1	0
90	0	-1	-2	-1	-2	-1	-2	-1	-2	-3	-2
91	0	1	2	1	0	-1	0	-1	0	1	2
92	0	1	0	-1	0	1	0	1	2	3	2
93	0	-1	-2	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
94	0	-1	0	1	2	3	4	5	4	5	4
95	0	-1	-1	-1	-2	-1	-2	-3	-4	-3	-2
96	0	1	0	1	0	-1	-2	-1	-2	-3	-2
97	0	-1	0	1	0	-1	-2	-1	-2	-3	-4
98	0	1	0	-1	-2	-1	-2	-1	0	1	0
99	0	1	1	3	2	1	2	3	4	5	4
100	0	-1	0	1	2	1	2	3	4	5	6

## 52 行目を確認する

47	0	1	0	1	1
48	1	1	1	1	1
49	1	1	1	0	1
50	1	1	0	1	0
51	1	1	0	0	0
52	24	25	32	24	32
53					
54					

**50** 枚のうち、  
表になるのは何枚になりそうか






100 列に増やしてみなさい

A2 から A52 を範囲選択して，右クリックメニューで  
「コピー」

それを **F列から CV列**まで貼り付け





表が出た枚数の、**平均**と**標準偏差**を求めてみよう  
**標準偏差**は「ばらつき」の量

**平均 AVERAGE**

**標準偏差 STDEVP**

53	24.83
54	3.57786

セル **A53** に次の式

**=AVERAGE(A52:CV52)**


セル **A54** に次の式

**=STDEVP(A52:CV52)**


A52 から CV52 を範囲選択して、**挿入**を選び、

**ヒストグラム**を選ぶ

ヒストグラムとは：**頻度分布**



B	C	D	E	F	G	H
0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	0




# ヒストグラム



- 頻度分布（何が多くて、何が少ないか）を示したグラフ

**50** 枚コインを投げる． 表が出る確率は **0.5**  
表が出る枚数の**ヒストグラム**は





**50** 枚コインを投げる。表が出る確率は **0.5**

表が出る枚数の**平均**と**標準偏差**は

■ Excel（シミュレーション）では

53	24.83
54	3.57786
55	

**=AVERAGE(A52:CV52)**

**=STDEVP(A52:CV52)**

■ 数式では

**平均**                    25                    = **50 × 0.5**

**標準偏差**            3.535534 = **50 × 0.5 × (1 - 0.5)** の平

方根




## 7-3 正規分布

# 正規分布とは




- 正規分布とは、平均と標準偏差だけで頻度分布を考えること




# コイン投げと正規分布




- コイン投げのシミュレーションで，頻度分布を作った。
- コイン投げの回数を増やすと，頻度分布の形は，正規分布に近づく



10 回



50 回



500 回



# いまから行うこと



パラメータ

平均	300
標準偏差	20




Excel の **NORM.DIST** を使い、**正規分布** をプロット

頻度大




頻度小



# Excel 演習



- 新しくやりなおしたいので、次のように操作して、新しく空白のブックを作りなさい



「ファイル」を  
クリック

「新規」  
をクリック

空白のブック



- 次のように値を入力しなさい

	A	B
1	平均	300
2	標準偏差	20
-		

※ 数値はすべて半角



- A列に，次のように値を書き加えなさい

	A	B
1	平均	300
2	標準偏差	20
3		
4	250	
5	260	
6	270	
7	280	
8	290	
9	300	
10	310	
11	320	
12	330	
13	340	
14	350	
15		

※ 数値はすべて半角



次のように式を入力しなさい

**B4**に式「**=NORM.DIST(A4,B\$1,B\$2,FALSE)**」正規分布

	A	B	C	D	E	F	G
1	平均	300					
2	標準偏差	20					
3							
4	250	0.000876					
5	260						
6	270						
7	280						
8	290						
9	300						
10	310						
11	320						
12	330						
13	340						
14	350						
15							



**B4 の式を, B5からB14に「コピー&貼り付け」**しなさい。


右クリックメニューが便利

	A	B	C	D	E	F	G
1	平均	300					
2	標準偏差	20					
3							
4	250	0.000876					
5	260	0.0027					
6	270	0.006476					
7	280	0.012099					
8	290	0.017603					
9	300	0.019947					
10	310	0.017603					
11	320	0.012099					
12	330	0.006476					
13	340	0.0027					
14	350	0.000876					

# 次の手順でグラフを作成しなさい

	A	B
1	平均	300
2	標準偏差	20
3		
4	250	0.000876415
5	260	0.002699548
6	270	0.00647588
7	280	0.012098536
8	290	0.017603266
9	300	0.019947114
10	310	0.017603266
11	320	0.012098536
12	330	0.00647588
13	340	0.002699548
14	350	0.000876415

**A4 から B14 を  
範囲選択**




**「挿入」タブを  
クリック**



**「散布図（平滑線  
とマーカ）」を  
選ぶ**

## 正規分布がプロットされるので確認

※ 値や式はあとで使うので，消さないこと







# 正規分布の性質




平均や標準偏差が変わっても、**正規分布**の形は同じ




平均 100, 標準偏差 20



平均 100, 標準偏差 50



平均 300, 標準偏差 20



平均 300, 標準偏差 50

# 正規分布とは




- 正規分布とは、平均と標準偏差だけで頻度分布を考えること  
(単純な分布)
- 正規分布では、平均値のところに頻度大の山ができる

頻度大



頻度小





## 7-4 正規分布の活用例

# いまから行うこと



**50** 枚コインを投げる。表が出る確率は **0.5**

表が出る枚数の**平均**と**標準偏差**は、次のようになる

$$\text{平均} \quad 25 \quad = 50 \times 0.5$$

$$\text{標準偏差} \quad 3.535534 = 50 \times 0.5 \times (1 - 0.5) \text{ の平方根}$$

- 正規分布をプロットする
- 「表が **30** 枚以上になる**確率**」は？
- 「表が **35** 枚以上になる**確率**」は？
- 「表が **40** 枚以上になる**確率**」は？



- B1, B2 を次のように書き替えなさい

	A	B	C	D
1	平均	25		
2	標準偏差	3.535534		
3				

The image shows a spreadsheet interface. At the top, a formula bar displays 'B2' in a dropdown menu, followed by a vertical ellipsis, a cancel button (X), a confirm button (checkmark), a function button (fx), and the value '3.535534'. Below this is a table with columns A, B, C, and D. Row 1 contains '平均' (Average) in column A and '25' in column B. Row 2 contains '標準偏差' (Standard Deviation) in column A and '3.535534' in column B. The cell containing '3.535534' is highlighted with a green border.

※ 数値はすべて半角


- A4 から A14を， 次のように書き替えなさい

	A	B	
1	平均	25	
2	標準偏差	3.535534	
3			
4	0	1.57E-12	
5	5	1.27E-08	
6	10	1.39E-05	
7	15	0.002067	
8	20	0.041511	
9	25	0.112838	
10	30	0.041511	
11	35	0.002067	
12	40	1.39E-05	
13	45	1.27E-08	
14	50	1.57E-12	
15			

※ 数値はすべて半角



- 先ほど作成したグラフが自動で書き換わるので、確認しなさい
  - ※ 値や式はあとで使うので、消さないこと




# 分布と確率



表が **30 枚以上** になるのは :

下の図の **赤のエリア**

全体を 1 として **0.07865** 8 パーセントくらい



**30**




# 分布と確率 その②



表が **35 枚以上** になるのは :

下の図の **赤のエリア**

全体を 1 として **0.00234** 0.2 パーセント くらい



# 分布と確率 その③




表が **40 枚以上** になるのは :

**下の図の赤のエリア**

全体を 1 として **0.000011**

0.001 パーセントくらい





- C4 に式を入力しなさい

**C4**に式「**=NORM.DIST(A4,B\$1,B\$2,TRUE)**」**正規分布**

	A	B	C	D	E	F
1	平均	25				
2	標準偏差	3.535534				
3						
4	0	1.56709E-12	=NORM.DIST(A4,B\$2,TRUE)			
5	5	1.26982E-08				

※ 数値はすべて半角



- C5 に式を入力しなさい

## C5に式「=1-C4」

	A	B	C	D
1	平均	25		
2	標準偏差	3.535534		
3				
4	0	1.56709E-12	7.68731E-13	=1-C4
5	5	1.26982F-08		

※ 数値はすべて半角



**C4 と D4 を範囲選択**して，右クリックメニューで「**コピー**」

それを，**C5 から D14** に張り付け

	A	B	C	D
1	平均	25		
2	標準偏差	3.535534		
3				
4	0	1.56709E-12	7.68731E-13	1
5	5	1.26982E-08	7.70864E-09	1
6	10	1.39253E-05	1.10453E-05	0.99999
7	15	0.002066699	0.002338868	0.99766
8	20	0.041510751	0.078649609	0.92135
9	25	0.112837914	0.5	0.5
10	30	0.041510751	0.921350391	0.07865
11	35	0.002066699	0.997661132	0.00234
12	40	1.39253E-05	0.999988955	1.1E-05
13	45	1.26982E-08	0.999999992	7.7E-09
14	50	1.56709E-12	1	7.7E-13
15				



	A	B	C	D
1	平均	25		
2	標準偏差	3.535534		
3				
4	0	1.56709E-12	7.68731E-13	1
5	5	1.26982E-08	7.70864E-09	1
6	10	1.39253E-05	1.10453E-05	0.99999
7	15	0.002066699	0.002338868	0.99766
8	20	0.041510751	0.078649609	0.92135
9	25	0.112837914	0.5	0.5
10	30	0.041510751	0.92135039	0.07865
11	35	0.002066699	0.99766113	0.00234
12	40	1.39253E-05	0.99998895	1.1E-05
13	45	1.26982E-08	0.999999992	7.7E-09
14	50	1.56709E-12	1	7.7E-13
15				

■ 表が **30** 枚以上になる**確率**  
**0.07865**

■ 表が **35** 枚以上になる**確率**  
**0.00234**

■ 表が **40** 枚以上になる**確率**  
**0.000011**

(エクセルでは 1.1E-05 のように表示されることもある)

※ 値や式はあとで使うので、消さないこと



# 7-5 正規分布の活用演習

# 平均と標準偏差の例



<売り上げデータの例>

5月 7日 80個  
5月 8日 110個  
5月 9日 120個  
5月 10日 70個  
5月 11日 120個



平均 100  
標準偏差 20.97618

平均、標準偏差は  
計算で求まる





- A16 から A20 に次の値を入力しなさい

13	45	1.26982E-08	0.!
14	50	1.56709E-12	
15			
16	80		
17	110		
18	120		
19	70		
20	120		
21			

※ 数値はすべて半角



- B1 と B2 を書き替えなさい

**B1** に式「**=AVERAGE(A16:A20)**」平均

**B2** に式「**=STDEVP(A16:A20)**」標準偏差

	A	B	C	D
1	平均	100		
2	標準偏差	20.97617696		

※ 数値はすべて半角

- A4 から A14を，次のように書き替えなさい

4	80	0.01
5	85	0.01
6	90	0.01
7	95	0.01
8	100	0.01
9	105	0.01
10	110	0.01
11	115	0.01
12	120	0.01
13	125	0.00
14	130	0.00
15		

※ 数値はすべて半角



D 列を使って，確率を読み取りなさい。

D 列は「**以上になる確率**」を求めている

4	80	0.012071942	0.170177871	0.829822
5	85	0.014727958	0.237274572	0.762725
6	90	0.016975872	0.316776738	0.683223
7	95	0.018486122	0.405798755	0.594201
8	100	0.019018827	0.5	0.5
9	105	0.018486122	0.594201245	<b>0.405799</b>
10	110	0.016975872	0.683223262	0.316777
11	115	0.014727958	0.762725428	0.237275
12	120	0.012071942	0.829822129	0.170178
13	125	0.009348371	0.883335699	0.116664
14	130	0.006839414	0.92366931	0.076331
15				

■ 売上が **105 以上**  
になる**確率**」は？  
**0.405799**




**C列**を使って，確率を読み取りなさい。

**C列**は「**以下になる確率**」を求めている

4	80	0.012071942	0.170177871	0.829822
5	85	0.014727958	0.237274572	0.762725
6	90	0.016975872	0.316776738	0.683223
7	95	0.018486122	0.405798755	0.594201
8	100	0.019018827	0.5	0.5
9	105	0.018486122	0.594201245	0.405799
10	110	0.016975872	0.683223262	0.316777
11	115	0.014727958	0.762725428	0.237275
12	120	0.012071942	0.829822129	0.170178
13	125	0.009348371	0.883335699	0.116664
14	130	0.006839414	0.92366931	0.076331
15				

■ 売上が **105 以下**  
になる**確率**は？  
**0.594201245**


# 「以上」のイメージ



先ほどの  
エクセルファイルの D列

105

# 「以下」のイメージ



先ほどの  
エクセルファイルの C列

105